

II号炭疽芽孢疫苗

Erhao Tanju Yabaoyimiao

Anthrax Spore Vaccine, Live (Strain No.2)

本品系用炭疽杆菌II号菌株(CVCC 40202)接种适宜培养基培养，形成芽孢后，收获培养物，加灭菌的甘油溶液制成甘油苗或加氢氧化铝胶制成氢氧化铝胶苗。用于预防大动物、绵羊、山羊、猪的炭疽。

【性状】 甘油苗静置后为透明液体，瓶底有少量沉淀，振摇后呈均匀混悬液；氢氧化铝胶苗静置后，上层为透明液体，下层有少量沉淀，振摇后呈均匀混悬液。

【装量检查】 按附录3104进行检查，应符合规定。

【纯度检验】 按附录3306进行检验，应纯度。

【荚膜检查】 用体重200~250g豚鼠2只，各皮下注射疫苗0.5ml，死后剖检，取脾脏，涂片、染色、镜检，菌体应有荚膜。

【运动性检查】 取pH7.2~7.4马丁肉汤或普通肉汤1管，接种疫苗0.2ml，置37℃培养18~24小时，作悬滴检查，菌体应无运动性。

【芽孢计数】 取~~将~~疫苗3瓶，各用注射用水稀释，以~~接种~~普通琼脂平板进行芽孢计数(附录3405)。每毫升的活芽孢数，甘油苗为 $1.3 \times 10^7 \sim 2.0 \times 10^7$ CFU，氢氧化铝胶苗为 $2.0 \times 10^7 \sim 3.0 \times 10^7$ CFU。

【苯酚残留量测定】 按附录3201进行测定，应符合规定。

【安全检验】 用体重1.5~2.0kg兔4只，各皮下注射疫苗1.0ml，观察10日，应全部健活。

【作用与用途】 用于预防大动物、绵羊、山羊、猪的炭疽。免疫期，山羊为6个月，其他动物为12个月。

【用法与用量】 皮内注射。山羊，每只0.2ml；其他动物，每头(只)0.2ml。其他动物也可采用皮下注射，每头(只)1.0ml。

【注意事项】 (1) 使用前，应将疫苗恢复至室温，并充分摇匀。

(2) 山羊、马慎用。

(3) 本品宜秋季使用。在牲畜春乏或气候骤变时，不应使用。

(4) 接种时，应作局部消毒处理。

(5) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 (1) 20ml/瓶 (2) 50ml/瓶 (3) 100ml/瓶 (4) 250ml/瓶

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。