ICS 65.020.40
CCS B 64

DB 21

辽 宁 省 地 方 标 准

DB 21/T XXXX—2023

外来入侵植物定位监测技术规程 第 3 部分 假苍耳

Code of practice for positioning monitoring invasive alien plant III *Cyclachaena xanthiifolia*

(征求意见稿)

2023- XX - XX 发布 2023 - XX - XX 实施

辽宁省市场监督管理局 发 布

目　　次

前　　言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 基础信息调查 2
5 监测 2
6 风险评估与等级划分 3
7 标本采集、制作与处理 3
8 监测报告 3

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：沈阳农业大学、绥中县农业事务服务中心、辽宁省农业发展服务中心、辽宁先达农业科学有限公司。

本文件主要起草人：陈旭辉、杨远、白金、陈绍丽、催跃峰、秦永辉、李奇峰、赵红秋、乔木春、杜方、代佳琳、朱广艳、高健、尹嘉怡、韩旭、苗青、翟强、阚国仕。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅（沈阳市和平区太原北街2号）联系电话：024-23448867

文件起草单位通讯地址：沈阳农业大学（辽宁省沈阳市沈河区东陵路120号），联系电话：024-88487163；

绥中县农业事务服务中心（辽宁省葫芦岛市绥中县西关街387号），联系电话：0429-6116130

辽宁省农业发展服务中心（沈阳市和平区太原北街2号），联系电话：024-23448867

辽宁先达农业科学有限公司（辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号），联系电话：0429-2113111

外来入侵植物定位监测技术规程 第3部分 假苍耳

1 范围

本文件确立了外来入侵植物假苍耳调查、监测、评估、标本制作和数据上报的技术内容和要求。

本文件适用于对辽宁省外来入侵植物假苍耳开展调查和监测工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《外来草本植物普查技术规程》（NY/T 1861-2010）

《外来草本植物引入风险评估技术规范》（NYT 1851-2010）

《农业植物调运检疫规程》（GB 15569-1995）

《进出境植物和植物产品有害生物风险分析技术要求》（GB/T 20879-2007）

《农业植物调运检疫规程》（GB 15569-2009）

《林业植物产地检疫技术规程》（LY/T 1829-2009）

《外来树种对自然生态系统入侵风险评价技术规程》（LY/T 1960-2011）

《外来物种环境风险评估技术导则》（HJ 624-2011）

《引进林木种苗预防外来有害生物技术规程》（DB 65/T 3004-2009）；

《进出境植物及植物产品检疫抽样》（SN/T 2122-2008）

《植物有害生物鉴定规范》（SN/T 1848-2006）

《植物有害生物信息采集要求》（SN/T 2682-2010）

《植物有害生物远程鉴定技术规范》（SN/T 2968-2011）

《外来入侵植物防控技术》（SN/T 2961-2011）。

下列术语和定义适用于本文件。

3 术语和定义

3.1

外来植物 alien plant

出现在其过去或现在的自然分布范围及潜在扩散范围以外的植物物种、亚种或以下的分类单位。

3.2

外来入侵植物 invasive alien plant

在当地自然生态系统中具有生存繁衍能力、可能或已经对生态环境以及人类生产或生活造成明显损害或不利影响的外来植物。

3.3

假苍耳 *Cyclachaena xanthiifolia*

菊科假苍耳属一年生草本植物，原产北美洲，列入农业农村部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、海关总署、国家林业和草原局联合制定并发布的《重点管理外来入侵物种名录》。

4 基础信息调查

4.1 监测区域现状

监测区域包括入侵区域和潜在入侵区域。调查监测区域内植物、植被和生态环境现状，重点保护野生动物、珍稀濒危物种、重要经济物种的种类、分布和资源量。

4.2 假苍耳的引入途径

分析引种、粮食调运、交通运输、旅游、水利工程和洪水等自然、经济、社会活动中所有可能引进假苍耳的途径。

4.3 假苍耳的基本信息

分析通过4.2的各种途径可能引进的假苍耳种群，收集其生物学特征、经济和生态方面的危害及防控措施，包括但不限于生长繁殖特性、病虫害、天敌、原产地、生境、现有和潜在分布图版、对生态、经济、人畜健康的危害、现有的防控措施、控制成本等。

4.4 假苍耳监测和入侵风险评估情况

搜集4.3中的假苍耳已有监测和入侵风险评估报告，分析其评估结论、防控建议等信息。

5 监测

5.1 入侵区域

5.1.1 监测点的确定

根据NY/T 1861-2010要求设置监测点，在假苍耳新发生地可增加监测点位。监测点位一经确定，不得更改。

5.1.2 监测周期

一般为3～5年一次。针对危害较重地区，可1年一次。

5.1.3 监测时间

在监测周期内苗期和花果期开展不低于两次的监测。

5.1.4 监测内容

包括但不限于入侵区域生态环境状况和社会经济状况，假苍耳的种群大小、种群和群落结构、生长状态、生境需求、危害、防治措施等。

5.1.5监测方法

按NY/T 1861-2010要求开展监测，监测结果按附录B表B.1、表B.2和表B.3的格式记录。

5.2 潜在入侵区域

5.2.1 监测点的确定

对潜在入侵区域周边居民、种（养殖）植户、粮食储运单位、农业和林业管理人员等进行走访和踏查，确定假苍耳发生率，调查结果按附录B表B.4格式记录。当潜在入侵区域有较大概率出现假苍耳时，监测点设置按5.1.1执行。

5.2.2 监测周期

按5.1.2执行。

5.2.3 监测时间

根据离入侵区域较近的假苍耳特性相似，结合文献资料记载，选危害期进行。

5.2.4 监测内容

监测假苍耳是否发生。潜在入侵区域监测到假苍耳后，应立即调查其发生情况，并按5.1.4规定的内容进行监测。

6 风险评估与等级划分

6.1 从入侵与建立自然种群的可能性、传播与扩散的可能性、影响与危害评估和预防控制难度多个方面构建假苍耳入侵风险评估指标体系，该体系包括 5 个一级指标、15 个二级指标。指标内容见附录 C 表 C.1。

6.2 对不同级别指标进行权重赋值，将层内权重和层次间权重进行组合运算，得出入侵风险评估总分，分值真高风险赵大。依据总分值大小划分假苍耳入侵风险级别，可分为低风险、中风险、高风险和特高风险四级。

7 标本采集、制作与处理

7.1 假苍耳应制作成标本，妥善保存，以备复核。标本采集与制作方法应符合 SN/T 1848-2006 的规定。

7.2 监测中采集到假苍耳经鉴定、测量、取样和统计后进行无害化处理。

8 监测报告

8.1 监测活动结束后形成完整的假苍耳监测报告。根据入侵风险评估结果，判定监测区域假苍耳的危害程度，提出相应的措施建议。报告提纲见附录 C。

8.2 监测原始数据、记录表、照片和视频等均应整理后妥善保存。工作照片应有拍摄时间、地点、经纬度等水印信息。假苍耳标本幼苗期全株、营养生长期全株、花果期全株、果实（种子），并拍摄标本照片，且有标尺和色卡参照的株高和植株色彩信息，照片像素不低于 1000 万。

附录 A
（资料性）
假苍耳生物学特性

异　　名：*Iva xanthiifolia* Nutt., *Iva pedicellata* (Rydb.) Cory, *Euphrosyne xanthiifolia* (Fresen.) A. Gray, *Iva paniculata* Nutt., *Cyclachaena pedicellata* Rydb., *Iva xanthiifolia* var. pedicellata (Rydb.) Kittell

英 文 名：flaseragweed, falsesunflower, giantsumpweed, giant marsshelder horseweed

形态特征：菊科（Asteraceae）一年生草本。茎直立，高达 2 m，有分支，下部无毛或有毛。叶对生，茎上部叶互生；互生叶有长柄，疏被柔毛；叶片广卵形、卵形、长圆形或近圆形，基部楔形，先端渐尖或长尾状尖，边缘有缺刻状尖齿，表面被糙毛，背面密被柔毛。三出基脉。花单性，同一头状花序上既有雌花又有雄花，全部为管状花，着生在圆锥形的花序托上；头状花序多数，近无梗，于茎或分枝顶端形成穗状及圆锥状花序，花序轴被粘毛；雄花位于花序托的上部（即花盘中央），数目较多，每个篮状花序有十数朵雄花，每个雄花基部皆有一条形鳞片，雄花的花冠筒长约 2 mm，顶端膨大，下部较细，具 5 齿裂，雄蕊 5；花药长 0.8 - 1 mm，纵裂，花丝约 0.6 mm，花粉粒圆球形，具刺状突起，雄花中存在退化雌蕊，退化花柱较长，约 l.2 mm，退化柱头盘状；雌花位于花序托下部（即花盘边缘），通常 5 个，位于总苞片内方，在雌花与总苞片之间有一大型船形鳞片包围雌花，鳞片边缘有毛，雌花的筒状花冠退化成极短的膜质小筒，位于子房的顶端，包围花柱的基部，花柱较短，柱头二裂，子房倒卵形。果黑褐色，倒卵形，长 2.5 mm，宽 1 mm，基部狭楔形，先端平截，花冠宿存，腹面平，背面凸起；无冠毛。种子呈卵形，长约 3 mm，宽约 1 mm，千粒重为 1.243 g。

识别要点：叶柄疏被柔毛，三出基脉，叶片表面被糙毛，背面密被柔毛。花冠宿存；果黑褐色，倒卵形基部狭楔形，先端平截，无冠毛；腹面平，背面凸起。

生长习性：能够适应多种土壤条件。通常每株产种子 2 000 - 3 000 粒，发育良好植株可结种子万粒以上。花期 7 - 8 月，果期 8 - 9 月。

危　　害：是重要的危险性植物，在我国属检疫性杂草，列入我国潜在危害性入侵杂草之一，已被列入《中华人民共和国进境植物检疫危险性病、虫、杂草名录（三类）》，2023 年 1 月 1 日起，被列入重点管理外来入侵物种名录。以密集成片的单优势植物群落出现，大肆排挤本地植物，严重影响林木生长；进入农田，会对农作物带来严重的损失；在花粉期，易感人群接触花粉，引起花粉热，严重危害到人类及家畜的健康。

防治方法：严格检疫，我国在进口大豆、小麦中经常混有假苍耳。人工拔除可在结实期前进行；拔除后的植株可以用火烧处理。对正在结实期的植株，应先剪去果穗用塑料袋包好以防止种子扩散。再拔除地上部分和根状茎，就地统一集中烧毁或深埋。对于入侵面积较大的地区，可以用大型机械设备，如推土机、装有旋转式的轮式拖拉机等，将主要根系推到土壤表面，集中用火烧掉，不保留任何剩余部分。三氟硫甲基和苯嗪草酮进行分期施药。可以将人工、机械、化学及药用价值的利用等技术融合起来，以达到综合控制假苍耳入侵的目的。

原 产 地：北美洲。

首次发现时间与引入途径：1981 年在辽宁朝阳县首次发现，夹杂在进口农产品或货物无意带入。

传播方式：假苍耳的近距离传播主要靠风力，而在远距离传播方面主要靠交通工具携带传播。
分布区域：在东北主要分布于辽宁沈阳、朝阳、铁岭和阜新，黑龙江哈尔滨、齐齐哈尔、大庆和绥化。东北地区为其适生区。

附录 B

（资料性）

记录表

B.1 植物群落环境数据记录表内容见表 B.1。

表 B.1 植物群落环境数据记录表

调查者：_____调查日期：_____点位编号：_____样地面积：_____

群落类型：_____群落名称：_____

地理位置：_____省_____市（县）_____乡镇（街道） 经度：_____纬度：_____

海拔：_____相对高度：_____ 坡向：_____ 坡度：_____

土壤、岩石、地下水位：_____水域情况_____

周围情况：_____

动物活动情况_____

经济特点及利用情况：_____

表 B.2 假苍耳群落统计记录内容见表 B.2

表 B.2 假苍耳群落统计记录表

调查者：_____调查日期：_____点位编号：_____样地面积：_____ 总盖度：_____分层盖度度：I_____II_____II_____								
植物名称	层次	株（丛）数	覆盖度/%	聚生度/%	高度/m	物候期	生活力	备注
……								

表 B.3 假苍耳表型数据记录内容见表 B.3。

表 B.3 假苍耳表型数据记录表

调查者：_____调查日期：_____点位编号：_____样地面积：_____													
序号	根深(cm)	高度(cm)	基径粗(cm)	茎颜色	叶数	总叶面积(cm^2)	花序数	果实数	物候期	生活力	病害	虫害	备注
……													

表 B.4 潜在入侵区域踏查记录内容见表 B.4.

表 B.4 潜在入侵区域踏查记录表

调查者：_____调查日期：_____点位编号：_____经纬度：_____								
序号	踏查生境类型	访问人类型	踏查结果	出现次数	最早出现时间	危害	利用情况	备注
…								

注：访问人类型分为周边居民、种（养殖）植户、粮食储运单位、农业和林业管理人员

附录 C
（资料性）
风险评估指标体系

表 C.1 假苍耳入侵风险评估指标体系内容见表 C.1

表 C.1 假苍耳入侵风险评估指标体系

一级指标	二级指标	评价标准	赋分值
国内分布状况 P1	国内分布状况（P11）	50%以上	0
		20%-50%	1
		1-20%	2
		无分布	3
潜在的危害性(P2)	经济危害性(P21)	损失 20%以上	3
		损失 20%-5%	2
		损失 5%-1%	1
		损失小于 1%	0
	是否为传播媒介(P22)	可传带 3 种以上	3
		可传带 2 种	2
		可传带 1 种	1
		不传带	0
	国外重视程度（P23）	20 个以上国家将其列为检疫对象	3
		10-19 个国家将其列为检疫对象	2
		1-9 个国家将其列为检疫对象	1
		没有国家将其列为检疫对象	0
受害对象的经济重要性(P3)	受害对象种类(P31)	受害对象 10 种以上	3
		受害对象 9-5 种	2
		受害对象 4-1 种	1
		没有受害对象	0
	受害对象面积(P32)	350 万 hm^2 以上	3
		350-150 万 hm^2	2

		小于 150 万 hm^2	1
		无	0
	受害对象经济价值(P33)	根据应用价值、出口创汇判断定级	3
			2
			1
			0
移植的可能性(P4)	截获难易(P41)	经常被截获	3
		偶尔被截获	2
		只截获过少数几次	1
	运输中存活率(P42)	40%以上	3
		40%-10%	2
		10%-0	1
		0	0
	国外分布(P43)	50%以上国家有分布	3
		50%-25%国家有分布	2
		25%-0%国家有分布	1
		少数几个环境中	0
	国内适生范围(P44)	国内 50%以上的地区	3
		国内 50%-25%的地区	2
		国内 25%-0 的地区	1
		适生范围为 0	0
	传播力(P45)	空气传播	3
		活动力很强的介体传播	2
		传播力很弱的土传等	1
危险性管理难度(P5)	鉴定难度(P51)	可靠性很低	3
		非常可靠且简便快速	0
		介于两者之间	2、1
	除害难度(P52)	几乎完全不能杀死有害生物	3
		50%以下	2
		50%-100%	1
		100%	0
	根除难度(P53)	效果差	3

效果显著	0
介于之间	2、1

附录 D

（规范性）

综合评价值（R 值）

根据 R 值大小可以判断外来种的危险程度，R 值越大，其危害的程度就越大，计算方法如下：

$$P1 = \sqrt{P11 \times P12}$$

P2 = 0.6P21+0.2P22+0.2P23

P3 = Max (P31，P32，P33)

$$P4 = \sqrt[5]{P41 \times P41 \times P43 \times P44 \times P45}$$

P5 = (P51+P52+P53)/3

$$R=\sqrt[5]{P1 \times P2 \times P3 \times P4 \times P5}5$$

附录 E

（规范性）

假苍耳入侵风险性评估标准

表 E.1 假苍耳入侵风险性评估标准见表 E.1

表 E.1 假苍耳入侵风险性评估标准

R 值	风险等级	危害程度
0.0-1.5	4 级	低度危险
1.5-2.0	4 级	中度危险
2.0-2.5	2 级	高度危险
2.5-3.0	1 级	特别危险

附录 E
（规范性）
监测报告格式

E.1 报告提纲

第 1 章 总论

1.1 项目概况

包括任务来源、监测区域位置、项目目标与内容、实施期限、总经费等。

1.2 区域概况

包括监测区水文、气象概况、厂矿、种植业、仓储、旅游业等人类活动概况，区域生态环境历史演变；已报道的假苍耳情况，可能的引入途径；监测区域重点保护野生动植物、珍稀濒危物种、重要经济物种的种类、分布和资源量等。

1.3 工作组织

包括受委托时间、监测单位情况、人员组成与分工、监测计划与工作流程等。

第 2 章 监测方法与数据处理

2.1 监测点位与监测 时间

2.2 区域生态环境指标

包括土壤类型、植被类型、社会经济状况。

2.3 假苍耳种群与群落

包括监测区域假苍耳种群与群落监测方法。

2.4 潜在入侵区域现场勘查

2.5 数据处理

包括主要监测指标的计算与数理统计方法。

第 3 章 结果与分析

3.1 监测区域生态环境

3.2 假苍耳种群与群落

3.3 假苍耳物征

包括生物学特征、区域分布、生境需求、入侵途径、危害等。

第 4 章 入侵风险评估

4.1 评估指标

4.2 评估指标的计算方法

4.3 综合评估与等级划分

4.4 可能的防措施

第 5 章 结论与建议

E.2 附录

1）监测区域物种名录

2）假苍耳标本照片