ICS 65.020.30
CCS B 43

DB 15

内 蒙 古 自 治 区 地 方 标 准

DB XX/T XXXX—XXXX

# 阿拉善型绒山羊种羊饲养技术规范

Technical Specification for Raising Alxa Cashmere Goat Breeding

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

内蒙古自治区市场监督管理局　　发 布

# 前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由阿拉善盟畜牧研究所提出。

本文件由内蒙古自治区畜牧业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：阿拉善盟畜牧研究所、阿拉善左旗家畜改良工作站、内蒙古自治区农牧业科学院

本文件主要起草人：张强、伊祥生、金鹿等

# 阿拉善型绒山羊种羊饲养技术规范

## 1 范围

本文件规定了阿拉善型绒山羊种羊饲养的饲料与营养需要、饲养管理、疫病防治、病死羊处理和资料记录的技术规范。

本文件适用于阿拉善型绒山羊种公羊、种母羊及后备种羊的放牧饲养。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 1818 山羊抓绒技术规程

DB15/T 1580 舍饲绒山羊TMR日粮配制及饲喂规程

DB15/T 2244.3 绒山羊繁殖技术规范 第3部分：人工授精

DB15/T 2244.4 绒山羊繁殖技术规范 第4部分：妊娠分娩

DB15/T 2471 阿拉善型绒山羊

DB15/T 2474 阿拉善型绒山羊身份识别及建档立卡管理规范

DB15/T 2842 阿拉善型白绒山羊选育技术规范

## 3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

## 4 种羊选择

种公羊、母羊品种标准应符合DB15/T 2471规定的要求，公羊和母羊应达到特级、一级、二级以上标准。

## 5 身份标识

种羊应有规范的身份标识，身份标识符合DB15/T 2474规定的要求。

## 6 选育

种羊应进行规范选育，白绒山羊只能开展本品种选育，不能引入外血改良。选育符合DB15/T 2842规定的要求。

## 7 抓绒

阿拉善白绒山羊每年4月～5月抓绒，抓绒按照NY/T 1818标准执行。

## 8 饲料与营养

### 8.1 饲料及饲料添加剂

在白绒山羊不同的生理、生产阶段，应根据放牧草场产草情况和营养需要配制营养全面的日粮。日粮的配制，必须搭配富含蛋白质、能量、微量元素、维生素等营养物质的粗饲料、精料补充料、能量饲料及饲料添加剂等。

### 8.2 营养需要和微量元素

按照DB15/T 1580中内蒙古绒山羊推荐营养需要和绒山羊微量元素推荐需要执行。

## 9 饲养管理

### 9.1 分群

有条件的养殖户要根据绒山羊的性别、年龄、生产阶段、体况和预期的生产水平进行分群管理，以实施不同的饲养管理措施。种公羊应单独放牧、分圈饲养。

### 9.2 饲喂

#### 9.2.1 种公羊的饲喂

种公羊在配种前45天进行补饲，饲喂精料的量为配种期标准的60~70%，并逐渐增加，进入正式配种期后，除供给优质的青干草自由采食外，精料补充料喂量应0.7～0.8kg。

饲喂要定时，每天分早晚2次饲喂，不喂霉变、冰冻饲料。饲喂前半小时清扫饲槽。

#### 9.2.2 能繁母羊的饲喂

空怀期母羊在配种前1个月进行催情补饲，体重为40kg以上为宜，为提高受胎率做好准备。对少数膘情不好的母羊，要实行短期优饲。

母羊妊娠前期（妊娠前3个月）以饲喂优质青草、干草、多汁饲料为主，每只每日饲喂精料量不超过0.25kg。

母羊妊娠后期（妊娠后2个月）必须加强对妊娠后期母羊的饲养管理，保证其营养物质的需要，每只每日补精料0.35kg。

母羊临产前一周左右，转入产房，降低精饲料饲喂量，饮用清洁水，忌饮冰冻水。

哺乳前期应饲喂优质的青草、干草、多汁饲料和适当的精料，并提供充足的饮水，以提高泌乳量。在产后1-3天，对膘情好的母羊不应补饲太多的精料，以防止消化不良或发生乳房炎。

哺乳后期母羊可酌情补饲，每日饲喂精料量不超过0.35kg。羔羊要尽早断奶，断奶前5天，应减少母羊的多汁料和精料饲喂量，预防发生乳房炎。整个泌乳期应根据哺乳母羊的膘情和泌乳量，调整补饲量。

饲喂要定时，每天分早晚2次饲喂，不喂霉变、冰冻饲料。饲喂前半小时清扫饲槽。

### 9.3 饮水

每日应至少饮一次水，饮水前清理水槽，水源必须干净、无污染、无杂物，冬季不饮带冰碴的水。饮水后不能驱赶。

### 9.4 管理

#### 9.4.1 种公羊的日常管理

经过鉴定不宜留作种用的公羔按时断奶、去势。

种公羊非配种季节跟群放牧要佩戴防护布（阻止种公羊偷配）。

日常注重观察种公羊的健康状况（特别是在喂饲时观察），出现异常情况及时处理。

种公羊常年保持体质结实，不肥不瘦，精力充沛，性欲旺盛，精液品质好。

采用人工授精配种时，种公羊每天驱赶运动2小时，在配种前15天开始采精，排出死精，检查精液品质，精液品质达到优良才能进行输精。配种期采精，成年种公羊一天两次，育成种公羊一天一次，连续采精3～5天后休息一天。对精液密度较低、精子活力较差的公羊，可适量增加动物性蛋白质和胡萝卜并增加运动量。人工授精技术按照DB15/T 2244.3执行。

#### 9.4.2 能繁母羊的日常管理

繁殖母羊应常年保持良好的饲养管理条件，以完成配种、妊娠、哺乳和提高生产性能等任务。

适时调整羊群的繁殖状况，淘汰老龄和生长发育、哺乳性能不好的母羊，从而保证羊群繁殖性能。

母羊怀孕后一切管理措施都要围绕保胎来进行，进出圈要慢，翻山过沟要慢赶，饮水要防止滑倒和拥挤。妊娠最后2个月，切忌在羊出入羊舍和采食的时候相互拥挤造成流产。在夏季，由于气候热，体散热减少，采取搭建凉棚、早晚饲喂、改善羊舍的通风环境、满足饮水等措施，预防中暑。在冬季做好羊舍的保温工作。

母羊的分娩按照DB15/T 2244.4执行。

母羊分娩后1小时左右，胎盘即会自然排出，应及时取走，防止被母羊吞食养成恶习。若产后2～3小时羊胎衣仍不下，需采取及时措施。羔羊身上的黏液应尽可能让母羊舔干，以增强母性和认羔。母羊产羔后体质虚弱，需要快速恢复，应注意保暖、防潮、避风、保持安静休息。

#### 9.4.3 环境卫生

每月要清理羊粪，对羊圈舍、周围环境、饲养用具进行消毒。

## 10 疫病防治

### 10.1 防疫

严格执行《中华人民共和国动物防疫法》，落实政府强制免疫工作及当地易发病的疫苗接种。

### 10.2 驱虫药浴

每年春秋两季进行驱虫药浴，间隔7-10天进行二次驱虫。

### 10.3 兽药使用

兽药使用严格执行《兽药管理条例》。

### 10.4 消毒

消毒应选用高效、低毒、对设备腐蚀性小的消毒剂，定期对环境、用具进行消毒，并定期更换消毒药物品种。

### 10.5 人员管理

羊场内工作人员应定期和不定期进行健康检查。

## 11 病羊和死羊处理

### 11.1 病羊的处理

发病羊及时隔离饲养并进行诊断治疗，同时做好羊群疾病预防措施。

### 11.2 染疫或病死羊的处理

国家规定的染疫或病死羊严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》规定进行处理。

## 12 资料纪录

### 12.1 建立养殖档案

养殖档案包括生产记录、消毒记录、饲料及饲料添加剂使用记录、兽药使用记录、免疫记录、诊疗记录、防疫监测记录、病死羊无害化处理记录等，养殖档案应保存2年以上。