ICS 65.020.20
CCS B05

DB 14

山 西 省 地 方 标 准

DB 14/T 1669—XXXX
代替 DB14/T 1669-2018

叶面营养剂防控枣裂果技术规程

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

山西省市场监督管理局　　发 布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 适用品种 1
5 枣园条件 1
6 叶面营养剂选择 2
7 喷施时间 2
8 喷施方法 2
9 果实采收 2
10 档案管理 2

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山西省林业和草原局提出、组织实施和监督检查。

山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省林业和草原标准化技术委员会（SXS/TC09）归口。

本文件起草单位：山西农业大学。

本文件主要起草人：张鹏飞、高培芳、刘亚令、杨凯、续海红、温鹏飞、高燕、牛铁泉、梁长梅。

本文件代替DB14/T 1669—2018《叶面营养剂防控枣裂果技术规程》，与DB14/T 1669—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加了术语和定义“完熟期”（见3.3）；
b) 增加了档案管理（见10）；
c) 修订了规范性引用文件（见2，2018年版的2）；
d) 修订了术语和定义“白熟期”“脆熟期”“枣裂果”（见3.1、3.2、3.4，2018年版的3.1、3.2、3.3）；
e) 修订了适用品种的规定（见4，2018年版的4）；
f) 修订了枣园条件的规定（见5，2018年版的5）；
g) 修订了喷施方法的规定（见8，2018年版的8）。

本文件于2018年首次发布，本次为第一次修订，DB14/T 1669—2018同时废止。

叶面营养剂防控枣裂果技术规程

1 范围

本文件规定了叶面营养剂防控枣(*Ziziphus jujuba* Mill.)裂果的适用品种、枣园条件、叶面营养剂喷施、果实采收及档案管理等要求。

本文件适用于裂果严重的枣品种。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

LY/T 2825 枣栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

白熟期

枣果皮颜色开始褪绿变白至着色前的时期，此阶段果实表面无红色。

3.2

脆熟期

枣果皮开始着色至完全着色前的时期，此阶段果实表面覆盖红色为1/5 ~ 4/5。

3.3

完熟期

枣果皮完全着色后即进入完熟期。

3.4

枣裂果

枣果实白熟期至脆熟期，因降雨、空气湿度大等原因导致果皮开裂的现象。

4 适用品种

主要有壶瓶枣、骏枣、木枣、板枣、屯屯枣、油枣、官滩枣、相枣、郎枣、赞皇大枣等。

5 枣园条件

适用于平地、坡地等大田枣园，树冠高度以不超过5 m为宜。枣园日常管理措施按照LY/T 2825的规定执行。

6 叶面营养剂选择

选用具有预防枣裂果功能的叶面营养剂。

7 喷施时间

在枣果实白熟期开始时第1次喷施，以后每隔8 d～10 d喷施1次，共喷5次～6次。

8 喷施方法

按照叶面营养剂的使用说明进行配比，均匀喷施于树体叶面、果面，喷液量为750 kg/hm^2～1800 kg/hm^2，喷施时需避开高温时段。不得与植物生长调节剂等混配喷施。

9 果实采收

以鲜食为目的的枣果实在脆熟期至完熟期的前期采收，以制干为目的的枣果实在完熟期采收，并适当晚采。

10 档案管理

记录叶面营养剂种类、喷施时间、地点、喷施量等，调查评估枣裂果防控成效，及时收集整理，归档保存。